

Amistar 50 WG


Gránulos Dispersables en Agua - WG
Fungicida Agrícola
Reg. PQUA N°: 020 – SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú
Rene Descartes 170, Urb. II Etapa, Ate Vitarte – Lima
RUC: 20501511740
Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876

1. CARACTERÍSTICAS / BENEFICIOS

CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Amistar® 50 WG es un nuevo fungicida del grupo de las Strobilurinas.	Amistar® 50 WG se absorbe gradualmente por las hojas y se moviliza tanto por el xilema (sistémico) como traslaminarmente a través de las células. Amistar® 50 WG inhibe la respiración de los hongos al unirse al citocromo b mitocondrial y así bloquear la transferencia de electrones entre el citocromo b y el citocromo c; de esta manera se evita la energía necesaria para su crecimiento y desarrollo.

2. GENERALIDADES

Ingrediente Activo:	Azoxystrobin
Nombre Químico: (IUPAC)*	methyl (E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3-methoxyacrylate
Formulación:	Gránulos dispersables (WG)
Concentración:	50 %
Nombre Comercial:	AMISTAR® 50 WG
Fórmula Estructural:	 <p>The chemical structure shows a central pyrimidine ring with two oxygen atoms at the 2 and 4 positions. The 2-position oxygen is linked to a phenyl ring with a cyano group (CN) at the 3-position. The 4-position oxygen is linked to another phenyl ring, which is further substituted with a methoxy group (OMe) at the 3-position and a methacrylate group (CH=C(OCH3)COO-) at the 1-position.</p>

Fórmula Empírica:	C ₂₂ H ₁₇ N ₃ O ₅
Peso Molecular:	403.4
Grupo Químico:	Strobilurinas

*IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry.

3. PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS DE LA FORMULACIÓN

Estado Físico:	Sólido (Gránulos)
Flamabilidad:	No inflamable
Densidad:	0.54 g / cm ³
Solubilidad:	En agua: Miscible

4. TOXICOLOGÍA

LIGERAMENTE PELIGROSO – CUIDADO

LEER CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENER EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No re-ensasar o depositar el contenido en otros envases.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Durante la mezcla: Utilice mandil, camisa de manga larga, pantalón largo, tapaboca, careta de protección y guantes de látex.

- Durante la aplicación: Utilice camisa de manga larga, pantalón largo, botas y guantes de látex.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón.
- Evitar ingerir el producto.
- Produce irritación moderada a los ojos y a la piel. Evitar todo contacto directo.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de emergencia llamar a: CICOTOX: 080013040 o CISPROQUIM: 080050847.
- Mientras llega el médico, retirar al paciente de la zona de peligro y llevarlo a un lugar donde haya aire fresco y este ventilado.

En caso de contacto con la piel Retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas.

En caso de contacto con los ojos Enjuagarlos con agua limpia durante varios minutos.

NOTA AL MÉDICO

En caso de ingestión Administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua y un laxativo. No inducir al vómito. Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.

No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.

En caso de incendio puede generar HCN y HS, administrar ampollas de Nitrito de Amilo por inhalación durante 10 a 15 segundos por cada minuto, mientras se prepara una solución fresca de Nitrito de Sodio al 3%, la que se inyecta por vía intravenosa a dosis de 10 ml a intervalos de 5 minutos.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES

- Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- No disponer con residuos municipales.

5. PROPIEDADES BIOLÓGICAS

MECANISMO DE ACCIÓN

Actúa como inhibidor de la respiración mitocondrial mediante la unión del sitio Qo del citocromo b, interrumpiendo el ciclo de energía dentro del hongo. Interfiere en el ciclo de vida del hongo, principalmente durante la germinación de las esporas y la penetración del tejido.

MODO DE ACCIÓN

Azoxystrobin muestra absorción gradual en las hojas. Es sistémico vía xilema, siendo transportado acropetalmente y de forma translinar dentro de las hojas. Debido a este particular modo de acción debe ser aplicado de manera preventiva.

INSTRUCCIONES DE USO

- Para la preparación, llenar el tanque con la mitad del agua a aplicar, empezar a agitar y simultáneamente echar la cantidad de Amistar® 50 WG a utilizar, agitar bien hasta obtener una mezcla homogénea y finalmente completar la cantidad de agua.
- Amistar® 50 WG puede ser aplicado con cualquier equipo terrestre (pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado), siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia del tipo cono vacío).
- Amistar® 50 WG debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas.
- Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación así como el ritmo de aplicación del aplicador.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

6. CAMPOS DE APLICACION (USOS) Y DOSIS

Cultivo	Blanco Biológico		Dosis		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	g/200L	g/ha		
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	60 - 80	150-200	0	4
Arándanos	Alternariosis	<i>Alternaria tenuissima</i>		300 – 350	14	0.5
Arroz	Pudrición de la vaina	<i>Rhizoctonia solani</i>	80 - 100	80 – 100	28	5
	Quemado de arroz	<i>Magnophorte grisea</i>	40 - 80	-	28	5
Cebolla	Mildíu	<i>Peronospora destructor</i>		250	2	1
	Tizón foliar	<i>Stemphylium vesicarium</i>	40-100			
Espárrago	Cercosporiosis	<i>Cercospora asparagi</i>		150	N.D.	0.05
	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>		150-250		
	Mancha Púrpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>		150-250		
Mango	Oidiosis	<i>Oidium mangiferae</i>	60-80	150-200	2	2
	Muerte Regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>				
	Antracnosis	<i>Colletotrichum gloesporoides</i>	60-100	-		
Marigold	Alternariosis	<i>Alternaria sp.</i>	80		N.A.	N.A.
Melón	Oidium	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	60 - 80	120 - 160	1	0.3
Ají Páprika	Alternariosis	<i>Alternaria sp.</i>	100-120	150 – 180	0	2
	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	60	150 - 200		
Sandía	Oidium	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	60 – 80	120 – 160	1	0.3
Vid	Oidium	<i>Uncinula necator</i>	100	200	14	1
Zapallo	Oidium	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	60-80	120-160	1	0.3
Palto	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	80-120	-	0	2

P.C.: Periodo de carencia **L.M.R.:** Limite máximo de residuos en partes por millón
ND: No determinado **NA:** No aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Para obtener un control óptimo y económico Amistar® 50 WG debe ser aplicado preventivamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad.
- El intervalo de aplicación puede variar entre 7 y 14 días, sin embargo este intervalo puede reducirse o incrementarse dependiendo de la presión de la enfermedad y de las condiciones ambientales para el desarrollo de la misma.
- Para evitar la aparición de resistencia, se recomienda no aplicar Amistar® 50 WG más de dos veces consecutivas, rotándolo siempre con productos de diferente modo de acción.

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada tan pronto se seque la nube de aspersion, aproximadamente 4 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Amistar® 50 WG es compatible con la mayoría de plaguicidas mas comúnmente utilizados; en caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas.

FITOTOXICIDAD

- Amistar® 50 WG, a la dosis y usos recomendados no muestra fitotoxicidad en ninguna de las etapas de crecimiento del cultivo.
- En la práctica no se han observado efectos negativos sobre otros cultivos diferentes a los aquí recomendados, ni sobre algún cultivo sembrado con posterioridad a aquel donde se aplicó Amistar® 50 WG.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas .

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.

Separadora Industrial Mz."E" Lote 12

Urb. Sta. Raquel 2da. Etapa Ate. Lima

Telf: 348-1103 Fax: 348-1020

RUC: 20307150981

FORMULADO POR:

Gowan Milling LLC (Para Syngenta)

12300 East County, 8th

Yuma, AZ 85365

Estados Unidos

Los nombres de producto que contengan ® o ™, el logo SYNGENTA y el marco CP FRAME son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta