

Cevya®

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRICOLA

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada (SC)

BASF
We create chemistry

CATEGORÍA	Fungicida
INGREDIENTE ACTIVO	Mefentrifluconazol
GRUPO QUÍMICO	Triazoles
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN	Mefentrifluconazol 400 g/L SC (Suspensión concentrada).
MODO DE ACCIÓN	Sistémico
CÓDIGO FRAC	3
VALOR DEL pH	Aprox 6-8
FABRICANTE / FORMULADOR	BASF S.A. SP-Brasil
TOXICIDAD	Ligeramente Peligroso Banda de color AZUL
ANTÍDOTO	No existe antídoto específico. Tratamiento sintomático
N° REGISTRO SENASA	PQUA- 2589- SENASA

MECANISMO DE ACCIÓN

Cevya® es un fungicida con mefentrifluconazol ingrediente activo que pertenece al grupo de los triazoles, y, por lo tanto, es un inhibidor de C-14 demetilasa en la biosíntesis del esteroles, posee acción preventiva, curativa y erradicante, sobre una amplia gama de patógenos en las plantas. Código FRAC 3.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Problema		DOSIS (L/ha)	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Arroz	Rhizoctoniasis	<i>Rhizoctonia solani</i>	0.40	35	0.01
Manzano	Oidiosis	<i>Podosphaera leucotricha</i>	0.35	14	1.5
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	0.35 - 0.45	28	0.01

P.C. = Período de Carencia.

L.M.R. = Límite máximo de residuos.

(En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino).

“Los períodos de carencia indicados en las recomendaciones de uso son para las condiciones locales. Según el artículo 42 del D.S. N° 006-2016-MINAGRI, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino”

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	<p>Se recomienda aplicar Cevya®, una aplicación por campaña por año para el cultivo de arroz y hasta dos aplicaciones por campaña por año para el cultivo de vid, como máximo, considerando una frecuencia de 14 días entre aplicaciones.</p> <p>Se debe aplicar a la observación de los primeros síntomas de la enfermedad. Se recomienda alternar con otros productos de diferente mecanismo de acción como estrategia de manejo anti-resistencia</p>
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA	<p>Aplicar Cevya® en aspersión foliar, con equipo manual o mecánico con presión constante. Calibre el equipo antes de aplicar el producto.</p> <p>Llene el tanque o cilindro hasta un tercio con agua (limpia), agregar la dosis recomendada para la enfermedad y cultivo, completar con agua y agitar constantemente hasta lograr una mezcla homogénea</p>
COMPATIBILIDAD	<p>Se debe de evitar aplicar Cevya® con productos de reacción alcalina, sin embargo, se recomienda realizar mezclas preliminares para evaluar la compatibilidad física, química y biológica de los productos.</p>
FITOTOXICIDAD	<p>Bajo las condiciones recomendadas, el producto no es fitotóxico para los cultivos indicados.</p>
REINGRESO AL ÁREA TRATADA	<p>En arroz y vid se recomienda reingresar pasadas las 12 horas de realizado el tratamiento</p>

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

FECHA DE REVISIÓN: SETIEMBRE 2020

BASF Peruana S.A.
 Oficinas y Fábrica
 Av . Oscar R. Benavides 5915
 Callao, Lima - Perú
 Central +51 1 513-2500
 Fax +51 1 513-2518
 E-mail basf_peru@basf.com
 www.basf.com.pe

Representantes exclusivos
 De BASF SE
 67056 Ludwigshafen
 Alemania

Registro
 Inscrita en la partida N° 11007979
 de la Oficina Registral de Lima y Callao

Certificación ISO 9001:2008
 Certificado PE13/175158
 "Fabricación y Comercialización de
 Productos Químicos para la Industria en
 General y Comercialización de Productos
 para la Protección de Cultivos"

