

Forum[®] 500 WP

Fungicida

BASF

We create chemistry

CATEGORÍA	Fungicida
INGREDIENTE ACTIVO	Dimetomorph
GRUPO QUÍMICO	Morfolinas
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN	Dimethomorph 500 g/Kg. WP (Polvo Mojable)
MODO DE ACCIÓN	Sistémico y traslaminar
CÓDIGO FRAC	Dimetomorph: 40
VALOR DEL pH	Aprox. 4-6
FABRICANTE / FORMULADOR	BASF CORPORATION Estados Unidos
TOXICIDAD	Ligeramente Peligroso. Banda de color AZUL
ANTÍDOTO	No se conoce antídoto Tratamiento sintomático y de sostén
N° REGISTRO SENASA	PQUA N° 112 - SENASA

MECANISMO DE ACCIÓN

Forum[®]500 WP (dimethomorph) del grupo químico de las morfolinas, actúa impidiendo la formación de la pared celular de hongos oomicetos como la rancha o hiello y el mildiu. **Forum[®]500 WP** tiene acción traslaminar (pasa de un lado a otro de las hojas) y sistémica hacia las partes superiores de la planta (brotes).

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Problema		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	Kg/Ha	g/200 L		
Cebolla	Mildiú	<i>Peronospora destructor</i>	0.36 – 0.40	150 – 200	14	0.60
Papa	Ranchar o hielo	<i>Phytophthora infestans</i>	0.36 – 0.40	150 - 200	14	0.05

P.C. = Período de Carencia. L.M.R. = Límite máximo de residuos. (En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

“Los períodos de carencia indicados en las recomendaciones de uso son para las condiciones locales. Según el artículo 42 del D.S. N° 006-2016-MINAGRI, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino”

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	Las aplicaciones deben de formar parte de un manejo integrado de cultivo. Se recomienda realizar hasta 2 aplicaciones con intervalos de 10 a 14 días, hacer rotaciones con productos sistémicos de diferente modo de acción y diferente grupo químico para evitar la aparición de la resistencia del hongo.
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA	Tome un recipiente pequeño y prepare una premezcla con agua, Forum® 500WP y el fungicida acompañante. Llene el tanque o cilindro de aplicaron hasta la mitad de la capacidad y agregue la premezcla, y por último llene el tanque agitando constantemente. De no haber experiencias en mezclas haga las pruebas de compatibilidad y eficacia previas
COMPATIBILIDAD	Forum® 500 WP se puede mezclar con la mayoría de los plaguicidas de uso frecuente. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de usar en campo definitivo.
FITOTOXICIDAD	No produce fitotoxicidad cuando se usa según las recomendaciones aquí dadas.
REINGRESO AL ÁREA TRATADA	Reingrese a los campos de cultivo después de 12 horas de realizada la aplicación de Forum® 500 WP
PRESENTACIÓN	Envase de 180 g. Por disponibilidad consultar con su distribuidor de confianza.

LEA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.

FECHA DE REVISIÓN: MAYO 2020

BASF Peruana S.A

Oficinas y Fábrica
Av. Oscar R. Benavides 5915
Callao, Lima - Perú
Central +51 1 513-2500
Fax +51 1 513-2518
E-mail basfperu@basf.com
www.basf.com.pe

Representantes exclusivos

De BASF SE
67056 Ludwigshafen
Alemania

Registro

Inscrita en la partida N° 11007979
de la Oficina Registral de Lima y Callao

Certificación ISO 9001:2008

Certificado PE13/175158
"Fabricación y Comercialización de
Productos Químicos para la Industria en
General y Comercialización de Productos
para la Protección de Cultivos"

