

Intrepid[®] 2F

Methoxyfenozide 248 g / litro

Formulación	: Suspensión concentrada (SC)
Modo de Acción	: Acción por ingestión
Mecanismo de Acción	: Acelera la muda de las larvas de Lepidópteros imitando a la hormona de la muda: ecdisona. La larva inicia una muda prematura y muere por deshidratación y hambre.
Toxicidad	: Ligeramente Peligroso.
Grupo Químico	: Benzoilhidrazina

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Novedoso insecticida correspondiente al grupo de los aceleradores de la muda. Altamente efectivo para el control de plagas de lepidopteros como *Heliothis* y *Spodoptera*. Tiene acción por ingestión. Ideal para Programas de Manejo Integrado de plagas, muy alta selectividad a los insectos benéficos.

Indicaciones de Uso

Se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua. Es recomendable preparar previamente una mezcla en un volumen reducido de agua agitando continuamente y luego y luego agregar el resto del agua al tanque.

Se puede mezclar con los plaguicidas más comunes. No mezclar con productos fuertemente alcalinos

Tiene buena fitocompatibilidad con lo cultivos recomendados siguiendo las instrucciones de uso

Primeros Auxilios

Si es ingerido por accidente dar de beber dos vasos con agua. No inducir el vomito ni dar de beber si la persona esta inconsciente. Acudir de inmediato al medico, entre tanto hacer reposar al paciente en un ambiente fresco, no desabrigarlo.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante 15 minutos.

Si es inhalado mueva a la persona afectada en un lugar fresco y ventilado. Si hay contacto del producto con la piel, lavar con abundante agua y jabón.

Indicaciones para el médico: Se sugiere lavado gástrico

Antídoto: No existe un antídoto específico. El tratamiento consiste en lavado gástrico y administración de abundantes líquidos por vía oral. Vigilar la respiración y dar tratamiento sintomático.

Manejo Integrado de Plagas

Recomendado para Programas de Manejo Integrado de Plagas, ya que no tiene ningún efecto sobre insectos benéficos, depredadores, ni parásitos.



Intrepid® 2F

Methoxyfenozide 248 g / litro

Recomendaciones de Uso

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS			PC* (días)	LMR** (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE TECNICO	l/ha	ml/cil	%		
Maíz	Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	0.25	125	0.0625	1	n/d
Espárrago	Barrenador de brotes	<i>Heliothis virescens</i>	0.3 - 0.4	150 - 200	0.075 - 0.1	n/d	n/d
		<i>Copitarsia decolora</i>	0.4	--	--	n/d	n/d
Vid	Comedor de hojas	<i>Pholus vitis</i>	--	60 - 100	0.03 - 0.05	30	1.0
Pimiento	Barrenador de brotes	<i>Heliothis virescens</i>	0.5	200	0.1	n/d	1.0
	Gusano perforador	<i>Symmetrischema capsicum</i>	0.6	--	0.12	n/d	1.0
Arveja Holantao	Barrenador de brotes	<i>Heliothis virescens</i>	0.4-0.5	200-250	0.1-0.125	n/d	0.2
Palto	Bicho del cesto	<i>Oiketicus kirbyi</i>	--	--	0.035-0.05	4	0.7

Iniciar las aplicaciones cuando las plantas tengan aproximadamente 15 cm de altura y se encuentren larvas de estadios L1 y L2.

*PC=Periodo de carencia (días)

**LMR=Límite Máximo de Residuos (ppm)

n/d = No determinado

Envases : Frasco x 1 Lt

Numero de Registro : 968-2000-AG-SENASA

