

Kanemite® SC

Acequinocyl 156 g/L



Formulación	: Suspensión concentrada.
Modo de Acción	: Acción por contacto.
Mecanismo de Acción	: actúa inhibiendo la transferencia de electrones al nivel del complejo III de la mitocondria.
Toxicidad	: Ligeramente Peligroso.
Grupo Químico	: Naftoquinonas.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Kanemite SC es un acaricida de contacto. El ingrediente activo es un derivado de la Naftoquinona, actúa inhibiendo la transferencia de electrones al nivel del complejo III de la mitocondria. El ingrediente activo es efectivo contra diferentes ácaros en todos sus estadios de vida desde huevos hasta adultos.

Indicaciones de Uso

Se aplica en pulverizaciones previa agua. Es recomendable preparar previamente una mezcla en un volumen reducido de agua agitando continuamente y luego agregar el resto del agua al tanque.

Se recomienda aplicar Kanemite SC realizando de 2 a 3 aplicaciones por campaña como máximo, considerando una campaña por año y una frecuencia entre aplicaciones de 20 días.

Se puede mezclar con los plaguicidas más comunes. Tiene buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados, siguiendo las instrucciones de uso.

Primeros Auxilios

En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al centro médico y muestre la etiqueta.

En caso de ingestión, no inducir al vómito. No administra nada por vía oral si la persona está inconsciente.

En caso de contacto con la piel, retire la ropa y calzado y bañese con abundante agua y jabón.

En caso de inhalación retirar a la persona a un lugar abierto y con aire fresco. Brindar respiración artificial si fuese necesario.

En caso de contacto con los ojos, lavarse abundantemente los ojos con agua por lo menos durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos, retirar lentes de contacto si los hubiera.

Antídoto:

Este producto no tiene antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

Teléfono de emergencia:

CISPROQUIM: 0800-050-847

14/06/2022



RESTRICTED

Kanemite® SC

Acequinocyl 156 g/L



Recomendaciones de Uso

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	%	l/ha*		
Mandarina	Arañita roja	<i>Panonychus citri</i>	0.075	1.65	30	0.35
Palto	Arañita marrón	<i>Oligonychus punicae</i>	0.075	--	14	0.5

Envases : Frasco x 1 L
Galenera x 5 L

Número de Registro : PQUA N° 2672- SENASA

14/06/2022



RESTRICTED