



DuPont™ Lannate® 40 SP

insecticida agrícola

Revisado Abril de 2016

Ficha Técnica

I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO	
Nombre del Principio Activo:	Metomil
Nombre comercial del producto:	Lannate® 40 SP
Familia Química:	Carbamatos
Uso:	Insecticida
Presentaciones:	135g
Categoría Toxicológica:	Amarillo – Moderadamente Peligroso
Registro:	Registro No. PQUA N° 1340 - SENASA
Información del proveedor	
Nombre:	DUPONT DE COLOMBIA S.A.
II. FÓRMULA O COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO	
Componentes activos:	Concentración
Ingrediente Activo	Metomil 400 g/Kg
Inertes:	Aditivos c.s.p. 1 Kilo
Otros componentes:	NO APLICA
III. PROPIEDADES BIOLÓGICAS	
Modo de acción:	Lannate® 40 SP es un insecticida sistémico que tiene rápida acción de contacto y por ingestión. Lannate® 40 SP es un producto soluble que se utiliza en forma de aspersión.
Forma de aplicación:	Llene el tanque con agua hasta un cuarto o la mitad de su capacidad. Empiece la agitación (use medios mecánicos o hidráulicos, no debe usarse agitación con aire) añada la cantidad adecuada de Lannate® 40 SP al tanque y continúe llenándolo con agua. Continúe agitando hasta antes de iniciar la aspersión.



DuPont™ Lannate® 40 SP

insecticida agrícola

Ficha Técnica

Revisado Abril de 2016

Cultivo				Dosis (Kg/ha)
Tomate Gusano del fruto (<i>Spodoptera eridiana</i>)				0,675 – 0,8
Maíz Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>) Gusano de la mazorca (<i>Heliothis zea</i>) Barrenador del tallo (<i>Diatraea saccharalis</i>)				0,5 – 0,55 0,55 – 0,6 0,8 – 0,9
Pimiento Barrenador de Brotes y Frutas (<i>Heliothis Virescens</i>)				0,675 – 0,8
PHI	Tomate: 1 día Maíz: 21 días Pimiento: 3 días	RI	72 horas	COMPATIBILIDAD Es compatible con la mayoría de los insecticidas y fungicidas. Evitar aplicar en mezcla con agua o productos alcalinos, en caso de cualquier inquietud hacer una prueba de compatibilidad previa a su uso.
Primeros Auxilios: Grupo Químico: Carbamato En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele esta etiqueta. ANTÍDOTO: Tratamiento: Utilice sulfato de atropina para el tratamiento. Administre dosis repetidas de 1.2 a 2.0 mg, vía intravenosa, cada 10 a 30 minutos hasta alcanzar una atropinización completa. Mantenga la atropinización hasta que el paciente se recupere. La respiración artificial u oxígeno pueden ser necesarios. No permita la exposición a inhibidores de la anticolinesterasa hasta asegurar la recuperación.No utilice 2-PAM para exposiciones con Lannate® 40 SP únicamente. Sin embargo, para exposiciones combinadas de Lannate® 40 SP con insecticidas organofosforados, el 2-PAM puede ser utilizado como suplemento al tratamiento con sulfato de atropina, descrito anteriormente. No utilice morfina.				EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAMAR A: CICOTOX: 0800-13040 CISPROQUIM: 0800-50847 ESSALUD: 0801-10200