

Movento® Plus

Imidacloprid 360 g/L Spirotetramat 120 g/L



Formulación	: Suspensión Concentrada (SC).
Modo de Acción	: Sistémico y de contacto.
Mecanismo de Acción	: Inhibe la síntesis de los lípidos e interfiere en la transmisión de estímulos a nivel del sistema nervioso central.
Toxicidad	: Moderadamente Peligroso.
Grupo Químico	: Ketoenoles o Ácidos Tetrámicos y Neonicotinoides

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

MOVENTO PLUS es un insecticida agrícola formado por dos ingredientes activos Spirotetramat, que inhibe la biosíntesis de los lípidos (Grupo 23 IRAC) afectando los procesos biológicos del insecto como la muda y fecundidad, e Imidacloprid que interfiere en la transmisión de estímulos a nivel del sistema nervioso central. (4A)

Indicaciones de Uso

Se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua. Agite el producto antes de utilizarlo. Llenar el tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad. En un recipiente aparte mezclar el producto en agua hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque del equipo y complete el volumen de agua a utilizar.

Se aplica en forma general cuando comienza el ataque de los insectos, previa evaluación del nivel de daño económico.

Antes de mezclar con insecticidas, fungicidas o abonos foliares realizar una prueba de compatibilidad.

Movento Plus posee buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados, siguiendo las instrucciones de uso.

Primeros Auxilios

En caso de ingestión no inducir al vómito, llamar al médico o acudir a un centro de salud. No administre nada a una persona inconsciente. En caso de contaminación de la piel, quite la ropa y enjuague el área afectada con abundante agua y jabón. Si los síntomas persisten acudir al médico.

En caso de contaminación en los ojos, enjuagar con abundante agua por lo menos 15 minutos. Acudir a un centro médico si se desarrolla irritación.

En caso de intoxicación por inhalación, retire al paciente de la zona de contaminación, llévelo al aire libre y mantenga al paciente en reposo y vigile que éste respire. Llamar al médico inmediatamente.

Indicaciones para el médico: Tratamiento sintomático y de sostén. Mantenga libres las vías respiratorias y si es necesario por medio de respiración controlada.

Antídoto: Tratamiento sintomático

06/03/2019



Movento® Plus

Imidacloprid 360 g/L Spirotetramat 120 g/L



Recomendaciones de Uso

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	L/ha	l/cil		
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.6	0,3	7	1 Imidacloprid 2.5 Spirotetramat
Tomate	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.6	0.3	7	1 Imidacloprid 2.5 Spirotetramat
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.6	--	46	0.05 Imidacloprid 0.1 Spirotetramat

*PC=Periodo de carencia (días)

**LMR=Límite Máximo de Residuos (ppm)

Envases : Frasco x 250 ml
Frasco x 1 L
Galonera x 5 L

Número de Registro : PQUA N°361-SENASA

06/03/2019

