

Producto	:	OMEX K 50[®]
Clase de uso	:	Fertilizante Foliar
Formulación	:	Concentrado Soluble
Distribuidor	:	SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Composición	:	Potasio (K₂O)..... 50 % p/v EDTA..... 1.0 % p/v

CARACTERÍSTICAS

OMEX K - 50[®] es un FERTILIZANTE FOLIAR en suspensión con 50 % de Potasio, elemento que le da calidad a los órganos de reserva de la planta (tubérculos, frutos y granos) y le confiere resistencia en situaciones de estrés (heladas, sequías, etc.).

COMPATIBILIDAD

OMEX K - 50[®] es compatible con la mayoría de plaguicidas y fertilizantes foliares de uso común. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

EFEECTO SOBRE LOS CULTIVOS

OMEX K - 50[®] no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

CUADRO DE USOS

CULTIVOS	DOSIS		MOMENTOS DE APLICACIÓN
	L/ha	L/200 L	
AJÍ, PÁPRIKA, PAPA, TOMATE	2.0 - 3.0	1.0	Para incrementar el tamaño, color y peso de frutos o tubérculos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Durante el crecimiento vegetativo. ▪ Durante el desarrollo del fruto, tuberización; hasta 40 días antes de la cosecha.
ALCACHOFA	2.0	1.0	Para incrementar la translocación de los almidones y fotosintatos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inicio de cosecha, repetir cada 7 - 10 días. ▪ Mezclar con Omex 20-20-20, Borón 15 F.
ALGODÓN	2.0	1.0	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aplicar al 5% de apertura de bellotas, en mezcla con Rumba.
ARROZ	2.0	1.0	Para favorecer e incrementar el llenado uniforme de los granos dándole mayor peso: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Llenado de granos. ▪ Entre la 2da y 3era semana antes de la cosecha.
CEBOLLA AMARILLA (EXPORTACIÓN)	2.0	1.0	Para incrementar la tolerancia a enfermedades y obtener bulbos grandes y uniformes: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 15 días después del transplante. ▪ Al inicio de la bulbificación. ▪ Al inicio de la maduración.

CULTIVOS	DOSIS		MOMENTOS DE APLICACIÓN
	L/ha	L/200 L	
CÍTRICOS, MELOCOTONERO, MANGO, PALTO	2.0 - 4.0	1.0	Para incrementar la firmeza y crecimiento de fruto: <ul style="list-style-type: none"> ▪ En la prefloración. ▪ Durante el crecimiento y desarrollo del fruto.
ESPÁRRAGO	2.0	1.0	Para incrementar el número de turiones: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 40 días antes de la cosecha y luego a los 10 días después de la 1ra aplicación.
MENESTRAS	2.0	1.0	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aplicar al inicio de llenado de granos.
PIÑA	2.0	1.0	Para incrementar el tamaño y peso: <ul style="list-style-type: none"> ▪ En frutos jóvenes. ▪ En pleno desarrollo de fruto. ▪ A los 30 días antes de la cosecha.
VID	2.0 - 4.0	1.0	Para incrementar peso, color y tamaño del racimo: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Después de la cosecha. ▪ En la prefloración. ▪ 3 aplicaciones cada 15 días durante el pleno desarrollo de la baya.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398
ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS



- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

PRESENTACIONES COMERCIALES

OMEX K - 50[®] cuenta con las siguientes presentaciones: 500 ml, 1 L, 4 L, 20 L y 200 L.