

Provado® Combi 112.5 SC

Imidacloprid 100 g/l, Betacyfluthrin 12.5 g/l

Formulación	: Suspensión Concentrada (SC)
Modo de Acción	: Actúa por contacto e ingestión.
Mecanismo de Acción	: Interfiere en la transmisión de los impulsos del sistema nervioso de los insectos, como antagonista del receptor nicotínico de la acetilcolina y bloquea el paso de los iones sodio, perturbando la transmisión de los estímulos en el sistema nervioso.
Toxicidad	: Ligeramente Peligroso
Grupo Químico	: Cloronicotinílicos y Piretroides

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Insecticida muy eficaz para el control de Prodidiplosis en espárrago, pimiento y tomate. También controla mosca blanca en hortalizas, arrebatiado y gusano rosado en algodón. Ideal para una Estrategia de Manejo de Resistencia.

Indicaciones de Uso

Las aplicaciones deben contemplar los niveles de daño económico de las plagas, por lo que se recomienda realizar evaluaciones permanentes al cultivo para determinar los momentos de aplicación.

Se emplea en pulverizaciones previa mezcla en agua. Preparar una pre-mezcla en un volumen reducido de agua, luego agregar el resto de agua.

Se puede aplicar en mezcla con los principales plaguicidas y abonos foliares. Sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de las aplicaciones.

Tiene buena fitocompatibilidad con el cultivo recomendado siguiendo las indicaciones de uso.

Primeros Auxilios

Se debe retirar las prendas contaminadas, lavar la piel con abundante agua y jabón. No se debe utilizar solventes. Lavar las partes expuestas al contacto, abrigarlo bien. Si se han contaminado los ojos, lavarlos con abundante agua corriente por lo

menos durante 15 minutos. Dar de beber abundante agua. Hacer reposar al paciente en un ambiente fresco. Trasladar y colocar al paciente en posición lateral estable y acudir de inmediato al médico.

Antídoto: No se ha determinado un antídoto específico. Tratar sintómicamente.

Manejo Integrado de Plagas

Puede ser dañino a los insectos benéficos

Abejas: Es tóxico a abejas



Provado® Combi 112.5 SC

Imidacloprid 100 g/l, Betacyfluthrin 12.5 g/l

Recomendaciones de Uso

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS			PC* (días)	LMR** (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE TECNICO	%	ml/cil	l/ha		
Espárrago	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.15	300	0.75	21	1.0
Arveja	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	-	-	1	21	4.0
Pimiento	Mosquilla de los brotes	<i>Prodiplosis longifila</i>	0.35	-	1.5	14	0.3
Arroz	Sogata	<i>Tagosodes orizicolus</i>	0.25	500	0.5	21	Imidacloprid: 1.5 Betacyfluthrin: 0.02
Cebolla	Thrips	<i>Thrips tabaci</i>	-	-	1.4	14	0.02

*PC=Periodo de carencia (días)

**LMR=Límite Máximo de Residuos (ppm)

Envases

: Frasco x 250 ml
Frasco x 500 ml
Frasco x 1 lt

Numero de Registro

: PQUA N° 032-SENASA

