

Ronstar[®] 25 EC

Oxadiazon, 250 g/litro

Formulación	: Concentrado Emulsionable (EC).
Modo de Acción	: Herbicida pre-emergente selectivo de amplio espectro con efecto de contacto y baja sistemicidad.
Mecanismo de Acción	: Causa la degradación de la clorofila y la ruptura de las membranas celulares al inhibir la PPO (Protoporphyrinogen Oxidasa).
Toxicidad	: Moderadamente Peligroso.
Grupo Químico	: Oxidazoles

PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Insecticida pre-emergente selectivo para los cultivos de arroz, cebolla y algodón; que controla malezas gramíneas, de hoja ancha y ciperáceas.

Indicaciones de Uso

Ronstar 25 EC es un herbicida pre-emergente que debe ubicarse uniformemente en el suelo para una acción eficiente, requiere una buena preparación de éste para que la superficie esté mullida y no haya terrones al momento de la aplicación.

Primeros Auxilios

En caso de presentarse síntomas de intoxicación, llamar al médico, mientras tanto retire al paciente de la labor para que no continúe en contacto con el producto, colocándolo en un lugar bien ventilado, quitarle la ropa y lavar con agua limpia y jabón todas las partes del cuerpo que hubieran sido contaminadas. Enjuagar bien los ojos con bastante agua limpia y fresca.

Antídoto: No tiene antídoto específico, por lo que el médico instituirá el tratamiento sintomático correspondiente.



Ronstar[®] 25 EC

Oxadiazon, 250 g/litro

Recomendaciones de Uso

CULTIVO	MALEZAS		l/ha			PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	Siembra directa	Trasplante			
ARROZ	Moco de pavo	<i>Echinochloa cursgalli</i>	Costa 3.0-4.0	Costa 2.5-3.0	-	Se recomienda no aplicarlo 60 días antes de la cosecha	Grano 0.05 Paja 0.02
	Gramma lefe	<i>Echinochloa coloum</i>					
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>					
	Pajilla	<i>Chloris radiata</i>					
	Plumilla	<i>Leptochloa uninervia</i>					
	Mazorquilla	<i>Ischaemun rugosum</i>					
	Digitaria	<i>Digitaria sanguinalis</i>					
	Rabo de zorro	<i>Setaria verticillata</i>					
Pisito	<i>Eleocharis geniculata</i>	Jaén Bagua 2.5-3.0	Jaén Bagua 2.0-2.5				
Coco	<i>Cyperus difformis</i>						
CEBOLLA	Yuyo hembra	<i>Amaranthus gracilis</i>	2.0-2.5	2.0-3.0	-		
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	2.0-3.0				
ALGODÓN	Botoncito	<i>Eclipta alva</i>	2.0-3.0	-	-		
	Clavo de agua	<i>Jussiaea linifolia</i>					
PIMIENTO	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	-	2.0	-		0.05
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>					
VID	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	-	-	1.75-2.0	60	0.05
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>					
ESPÁRRAGO	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	-	-	1	7	0.05
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>					
	Yuyo	<i>Amaranthus hybridus</i>					
	Hierba de gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>					
MANDARINA	Yuyo	<i>Amaranthus hybridus</i>	-	-	1.5-.175	N.d.	0.05
	Hierba de gallinazo	<i>Chenopodium murale</i>					
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>					
	Lecherita	<i>Euphorbia sp.</i>					
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>					

*PC=Período de Carencia (días)
 **LMR=Límite Máximo de Residuos (ppm)
 N.d.=No determinado

Envases : Frasco x 1lt.

Numero de Registro : 209-96-AG-SENASA

