

FICHA TÉCNICA "SANIX Cu[®]"

EMPRESA: Comercial Andina Industrial S.A.C.

PRODUCTO: **SANIX Cu[®]** - FITO-CICATRIZANTE CUPRICO

I.- N^o. REG. No aplicable

II.- INGREDIENTES ACTIVOS:

Sulfato de Cobre pentahidratado.....	50.00 g /kg
Betaina.....	2.80 g /kg
Sulfato de Zinc.....	7.00 g /kg
Propanol.....	100.00 g /kg
Acido alfa naftalenacetico.....	3000 ppm
Extracto de algas.....	20.00 g /kg
Aditivos.....	c.s.p. 1 kg

III.- CARACTERÍSTICAS: Físico - Químicas

• Estado Físico	Líquido pastoso
• Color	Verde
• Olor	Característico
• Densidad	1.40 g/cc +/- 0.05
• PH	8.0 +/- 0.5
• Inflamabilidad	No inflamable
• Explosividad	No explosivo
• Corrosividad	No corrosivo
• Estabilidad	Estable
• Estabilidad de almacenamiento	Estable 2 años a T ^o ambiente

IV.- FORMULACIÓN: Pasta (Pa)

V.- MODO DE ACCION:

SANIX Cu[®], es una pasta que genera una intensa regeneración celular sobre el punto de corte, además de proteger como una barrera mecánica las heridas causadas por las podas en los árboles frutales, así como heridas en material de propagación como son las estacas, injertos etc.

Aplicado el producto **SANIX Cu[®]** sobre las heridas forma una barrera protectora que impide el ingreso de microorganismos causantes de necrosis o pudriciones, que dañan los tejidos, impidiendo un normal desarrollo de las plantas.

VI.- RECOMENDACIONES DE USOS

SANIX Cu®, Es usado sobre las heridas luego de las podas e injertos en árboles frutales y ornamentales para favorecer la cicatrización de la herida e impedir el ingreso de hongos y bacterias causantes de pudriciones y canchros.

CUADRO DE USOS COMO PASTA PROTECTORA

CULTIVOS	ENFERMEDADES		DOSIS REFERENCIAL (kg/ha)
	Nombre común	Nombre científico	
Vid, Palto, Mango, Manzano, Cítricos, Arándanos, Olivo, etc	"Hongos de la madera"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	4.0 kg Pintando directamente sobre el corte de poda en los frutales.

VII.- MOMENTO DE APLICACIÓN:

Para lograr excelentes resultados se recomienda aplicar la pasta FITO-CICATRIZANTE **SANIX Cu®**. En forma directa sobre la herida ocasionada luego del corte y/o poda, mediante una brocha, se recomienda no efectuar riegos antes o inmediatamente después de aplicar **SANIX Cu®** Para evitar exudados excesivos sobre el punto de corte para la aplicación de la pasta.

VIII.- TOLERANCIAS Y CARENCIAS:

No aplicable por tratarse de un producto no biocida, cuya aplicación en campo se efectúa puntualmente sobre los cortes y heridas, principalmente en la época de poda de los frutales, además **SANIX Cu®**.

IX.- CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

No aplicable, por tratarse de una pasta No Biocida sin mayor riesgo toxicológico.



X.- DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

La empresa Comercial Andina Industrial S.A.C. no tendrá responsabilidad alguna por ninguna pérdida, sin limitación alguna, pérdidas directas, indirectas o consecuentes, lucro cesante, interrupción de negocios, pérdidas de ingreso, demandas, reclamos, acciones, daños y perjuicios, pagos, gastos u otras obligaciones ocasionadas como consecuencia del mal uso de la información contenida en esta Ficha Técnica.

File: Ficha Técnica / **SANIX Cu**[®] / 12.05.17

