



Producto	:	SINERGIGROW® COMPLEX	
Composición	:	Extracto Húmico Total (EHT)	24.60 % p/v
		Ácidos Húmicos (AH)	12.60 % p/v
		Ácidos Fúlvicos (AF)	12.00 % p/v
		Potasio (K ₂ O)	4.80 % p/v
Formulación	:	Líquido denso color negro	
Clase de uso	:	Enmienda orgánica natural de Leonardita	
Distribuidor	:	SILVESTRE PERÚ S.A.C.	

CARACTERÍSTICAS

SINERGIGROW® COMPLEX es una enmienda húmica líquida constituido por ácidos húmicos y fúlvicos, diseñado para mejorar las características físicas de los suelos (estructura, porosidad, densidad aparente y permeabilidad) gracias a la función de los ácidos húmicos procedente de la Leonardita; así mismo, mejora las características químicas de los suelos (capacidad de intercambio catiónico y pH) y las características biológicas (activación de los microorganismos benéficos del suelo) gracias al efecto de los ácidos fúlvicos. Adicionalmente, el potasio contenido favorece en la regulación del equilibrio hídrico de la planta.

SINERGIGROW® COMPLEX tiene excelentes beneficios para aquellos suelos que tengan problemas derivados de pH, conductividad eléctrica o clases texturales de difícil manejo. Definitivamente, el mejoramiento de las características del suelo apunta a desarrollar plantas vigorosas, con buen desarrollo radicular y tejidos fortalecidos; incrementando la resistencia de las plantas al estrés abiótico (sequía, elevadas y bajas temperaturas, fuertes vientos, toxicidad, etc.) y biótico (plagas y enfermedades), contribuyendo finalmente a un incremento significativo en el rendimiento del cultivo.

COMPATIBILIDAD

SINERGIGROW® COMPLEX, por su alto pH se recomienda antes aplicar un corrector de pH con buffer en la mezcla, y definitivamente realizar una prueba de compatibilidad, especialmente con productos de pH ácidos-neutros.

EFFECTO SOBRE LOS CULTIVOS

SINERGIGROW® COMPLEX no es fitotóxico en los cultivos si se siguen las recomendaciones dadas en el cuadro de usos.

	FICHA TÉCNICA	Revisión: 00 Aprobado: JID Fecha: 04-11-20 Página 2 de 3
		

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS		MOMENTOS DE APLICACIÓN
	Aplicación al Suelo (L/ha.aplic)	Aplicación Foliar (L/200L)	
AJÍ, TOMATE Y OTRAS SOLANÁCEAS	3.0 - 5.0	1.0 - 1.5	1. ^a A la aparición de 4 hojas verdaderas. 2. ^a Inicio de floración. 3. ^a Crecimiento y desarrollo de fruto.
ALCACHOFA	3.0 - 5.0	-	1. ^a 10 días después del trasplante. 2. ^a Al inicio de la emisión de la inflorescencia.
APIO, ZANAHORIA	3.0 - 5.0	1.0 - 1.5	1. ^a A partir de 4 hojas verdaderas. 2. ^a 30 días después de la aplicación anterior.
ARÁNDANO	3.0 - 5.0	-	1. ^a Al inicio del brotamiento. 2. ^a Al inicio de la floración. 3. ^a Después de la cosecha (para el descanso).
ARROZ	3.0 - 5.0	1.0 - 1.5	1. ^a En almácigo; 10 días después de la siembra. 2. ^a 10 días después del trasplante. 3. ^a En máximo macollamiento.
BRÓCOLI, COLIFLOR Y COL	3.0 - 5.0	1.0 - 1.5	1. ^a 10 días después del trasplante. 2. ^a Al inicio de la formación de cabeza.
CEBOLLA Y AJO	3.0 - 5.0	1.0 - 1.5	1. ^a En almácigo; a la aparición de 3 hojas verdaderas. 2. ^a 15 días después del trasplante. 3. ^a Inicio de bulbificación.
ESPÁRRAGO	3.0 - 5.0	1.0 - 1.5	1. ^a En almácigo; a la aparición de 3 hojas verdaderas. 2. ^a Inicio del primer y segundo brotamiento bulbificación.
FRESA	3.0 - 5.0	1.0 - 1.5	1. ^a 10 días después del trasplante 2. ^a Inicio de la floración. 2. ^a En crecimiento de frutos.
FRIJOL, ARVEJA Y HOLANTAO	3.0 - 5.0	1.0 - 1.5	1. ^a Al inicio de desarrollo de vainas. 2. ^a 15 días después de la primera aplicación.
FRUTALES CADUCIFOLIOS: MANZANO, MELOCOTÓN Y GRANADO	5.0 - 10.0	-	1. ^a Al inicio del brotamiento. 2. ^a Al inicio de la floración. 3. ^a Después de la cosecha (para el descanso). Se recomienda hacerse aplicaciones mensuales, tomando como referencia un total de 20-40 L/ha. campaña.
FRUTALES SIEMPREVERDES: MANGO, PALTO, OLIVO, CÍTRICOS, MARACUYÁ, GRANADILLA	5.0 - 10.0	-	1. ^a Al inicio del brotamiento. 2. ^a Al inicio de la floración. 3. ^a Después de la cosecha (para el descanso). Se recomienda hacerse aplicaciones mensuales, tomando como referencia un total de 20-40 L/ha. campaña.

	<i>FICHA TÉCNICA</i>		Revisión: 00 Aprobado: JID Fecha: 04-11-20 Página 3 de 3
	SINERGIGROW COMPLEX		

MAÍZ, TRIGO Y CEBADA	3.0 - 5.0	1.0 - 1.5	1. ^a A la aparición de 3 hojas verdaderas. 2. ^a En llenado de grano.
PAPA, OTRAS RAÍCES Y TUBEROSAS	3.0 - 5.0	0.5 - 1.0	1. ^a Sobre las semillas del surco. 2. ^a 15 días después de la emergencia.
PEPINO, SANDÍA Y MELÓN	3.0 - 5.0	0.5 - 1.0	1. ^a A la aparición de 4 hojas verdaderas. 2. ^a Inicio de floración.
VID	5.0 - 10.0	-	1. ^a Al inicio del brotamiento. 2. ^a Al inicio de floración. 3. ^a Después de la cosecha (para el descanso).

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

