



FICHA TÉCNICA



Revisión: 05
Aprobado: JR
Fecha: 13-06-14
Página 1 de 2

Producto	:	SUPERBUTAXIL® 400 WP
Ingrediente activo	:	Miclobutanil
Clase de uso	:	Fungicida Agrícola
Grupo Químico	:	Diphenyloxazoline
Formulación	:	Polvo Mojable
Concentración	:	400 g/kg
Registro	:	PQUA N° 419-SENASA
Titular	:	SILVESTRE PERÚ S.A.C.
Distribuidor	:	SILVESTRE PERÚ S.A.C.

TOXICOLOGÍA DEL PRODUCTO

SUPERBUTAXIL® 400 WP es un fungicida agrícola categorizado como **LIGERAMENTE PELIGROSO**.

MECANISMO Y MODO DE ACCIÓN

SUPERBUTAXIL® 400 WP es un fungicida triazol sistémico de amplio espectro; con acción protectora y curativa. Es rápidamente absorbido y distribuido dentro de la planta.

SUPERBUTAXIL® 400 WP pertenece a la familia IBE, por lo que su modo de acción está dado por la inhibición de la biosíntesis del ergosterol. Actúa sobre todas las fases del ciclo de desarrollo del hongo, como la producción y germinación de esporas, y el crecimiento micelial, evitando su propagación y reproducción.

CONSIDERACIONES PARA LA APLICACIÓN

- SUPERBUTAXIL® 400 WP es un fungicida sistémico, con movimiento a través del xilema con poder protectante y curativo.
- SUPERBUTAXIL® 400 WP inhibe la esporulación del hongo una vez que este ha ingresado a la planta, evitando su propagación y reproducción.
- SUPERBUTAXIL® 400 WP es utilizado en aplicaciones foliares para el control de enfermedades como manchas foliares.
- Aplicar a primeras horas de la mañana o por la tarde.
- Usar equipo de protección personal durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto.
- Asegurar que la aplicación del producto sea uniforme, verificando que los equipos de aplicación se encuentren debidamente calibrados.
- Rotar con productos de diferente modo de acción para evitar el desarrollo de resistencia de la plaga objetivo.

COMPATIBILIDAD

SUPERBUTAXIL® 400 WP es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con agentes fuertemente oxidantes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

	<i>FICHA TÉCNICA</i>	Revisión: 05 Aprobado: JR Fecha: 13-06-14 Página 2 de 2
		

FITOTOXICIDAD

SUPERBUTAXIL® 400 WP no es fitotóxico para los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	g/ 200 L	g/ ha		
ALCACHOFA	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	120	-	2	0.05
PIMIENTO	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	80	-	1	2.0
VID	Oidiosis	<i>Uncinula necator</i>	-	240	21	1.0

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite máximo de residuo

REGISTROS Y TOLERANCIAS DE RESIDUOS

Para informarse sobre los límites máximos de residuos (LMR) o tolerancias establecidas en los principales cultivos, visite los siguientes links:

EU Pesticide Database: (Comunidad Europea)

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=activesubstance.detail

Environmental Protection Agency EPA: (Estados Unidos)

<http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&SID=a4d7501dcfde7b6ba7e6c515ce652e4d&rgn=div8&view=text&node=40:25.0.1.1.28.3.19.181&idno=40>

[5.0.1.1.28.3.19.181&idno=40](http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&SID=a4d7501dcfde7b6ba7e6c515ce652e4d&rgn=div8&view=text&node=40:25.0.1.1.28.3.19.181&idno=40)

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX: 0-800-1-3040 o 328 7398

ESSALUD: 0801-10200 o 411 8000 (opción 4)

CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya el envase y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

PRESENTACIONES COMERCIALES

SUPERBUTAXIL® 400 WP cuenta con registro para las siguientes presentaciones:

Bolsa de 100 g, 200 g, 250 g, 500 g, 1 kg y 25 kg.

Caja de 1 kg.