


FICHA TECNICA TRASLATE

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa Comercializadora : FARMAGRO S.A.
Titular de Registro : FARMAGRO S.A.
Número de Registro : PQUA N°1114-SENASA

IDENTIDAD

Composición : Fosetil Aluminio
Concentración : 800 g/kg
Formulación : Polvo mojable
Grupo Químico : Organofosfonatos
Clase de Uso : Fungicida
Fórmula Empírica : C₆H₁₈AlO₉P₃
Fórmula Estructural:



CARACTERÍSTICAS

Traslate es un fungicida muy utilizado para el tratamiento de enfermedades producidas por hongos Oomicetos, en particular Mildiu, Phytophthora y Pythium. Además estimula mecanismos naturales de defensa en la planta, minimizando la posibilidad de aparición de cepas resistentes.

PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS

•Densidad Relativa : No aplicable
•pH : 3.0-5.0
•Estado Físico : Sólido
•Color : Insignificante
•Olor : Blanco
•Explosividad : No explosivo
•Corrosividad : No corrosivo
•Estabilidad en Almacenamiento : Es estable bajo condiciones normales de manipulación y almacenamiento por 2 años.

MODO DE ACCIÓN

Traslate tiene actividad sistémica completa: ascendente y descendente, una rápida penetración y acción preventiva y curativa.

MECANISMO DE ACCIÓN

Traslate actúa inhibiendo la germinación de esporas, bloquea el desarrollo del micelio y la esporulación. También actúa incrementando los mecanismos de defensa natural de la planta (fitoalexinas) frente a posibles ataques de enfermedades.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	kg/200 L	kg/ha		
Cebolla	Mildíu	<i>Peronospora destructor</i>	0.75	-	14	50
Pimiento	Pudrición radicular	<i>Phytophthora capsici</i>	-	1.5	3	130
Palto	Pudrición radicular	<i>Phytophthora cinnamomi</i>	0.5	-	14	50
Mandarina	Marchitez	<i>Phytophthora parasitica</i>	0.75	-	15	80

PC: Periodo de Carencia

LMR: Límite máximo de residuos

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar un riego antes de la aplicación, realizar como máximo 1 aplicación por campaña/año.

COMPATIBILIDAD

Traslate no es compatible con agentes oxidantes.

REINGRESO A UN ÁREA TRATADA

No ingresar a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD

Traslate no es fitotóxico siguiendo las recomendaciones de la etiqueta.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA

Ligeramente peligroso.