

Vivando® SC

Fungicida



CATEGORÍA	Fungicida
INGREDIENTE ACTIVO	Metrafenona
GRUPO QUÍMICO	Benzofenonas
CONCENTRACIÓN Y FORMULACIÓN	500 g/L SC (Suspensión Concentrada)
MODO DE ACCIÓN	Sistémico
CÓDIGO FRAC	Metrafenona: U8
VALOR DEL pH	Aprox. 7 - 9
FABRICANTE / FORMULADOR	Kemfine LTD. Finlandia BASF France Agri-Production. Francia
TOXICIDAD	Ligeramente Peligroso. Banda de color AZUL
ANTÍDOTO	No hay antídoto específico. Tratamiento sintomático.
N° REGISTRO SENASA	PQUA N° 239 – SENASA

MECANISMO DE ACCIÓN

Vivando®SC es un nuevo fungicida que tiene como ingrediente activo a la metrafenona, primera sustancia del nuevo grupo químico de los Benzofenona. El modo de acción específico aun es desconocido. Actúa impidiendo la penetración del hongo en el tejido de la planta. Ataca los estados vegetativos y reproductivos del hongo, previene la formación de apresorios, y causa malformaciones en el micelio.

RECOMENDACIONES DE USO

Cultivo	Problema		Dosis	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	L / ha		
Alcachofa	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.3	28	0.05
Manzano	Oidium	<i>Podosphaera leucotricha</i>	0.3	28	0.05
Melocotón	Oidium	<i>Sphaerotheca pannosa</i>	0.20 – 0.25	14	0.05
Pimiento	Oidium	<i>Leveillula taurica</i>	0.30	3	2.0
Vid	Oidium	<i>Uncinula necator</i>	0.25 – 0.30	28	5.0

P.C. = Período de Carenía. L.M.R. = Límite máximo de residuos. (En cultivos de exportación atenerse a las exigencias del país destino)

“Los períodos de carencia indicados en las recomendaciones de uso son para las condiciones locales. Según el artículo 42 del D.S. N° 006-2016-MINAGRI, para fines de exportación el usuario debe atenerse a las tolerancias establecidas en los países de destino”

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN	Realice hasta dos aplicaciones de Vivando® SC por campaña/año. En el caso de alcachofa las aplicaciones se deben realizar durante las etapas de crecimiento vegetativo – floración. En vid y manzano, realizar las aplicaciones cuando se alcance un nivel promedio de infección de 3 – 5%. En melocotón aplicar hasta floración antes de cuajado de frutos.
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA	Llenar el tanque o cilindro hasta un tercio con agua (limpia), agregar la dosis recomendada para la plaga y cultivo, completar con agua y agitar constantemente hasta lograr una mezcla homogénea. Agitar la mezcla antes de llenar el equipo de aplicación.
COMPATIBILIDAD	Vivando® SC se puede mezclar con la mayoría de fungicidas, insecticidas, no es compatible con los plaguicidas de reacción alcalina. Se recomienda que las mezclas con productos comerciales sean sometidas a pruebas preliminares de compatibilidad física, química y de eficacia biológica.
FITOTOXICIDAD	No se ha reportado efectos tóxicos en los cultivos tratados a las dosis que se indican en el cuadro de usos.

**REINGRESO AL ÁREA
TRATADA**

Reingrese a los campos de cultivo después de 12 horas de realizada la aplicación.

PRESENTACIONES

Envase de 0.25 y 1 L. Por disponibilidad consultar con su distribuidor de confianza.

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

FECHA DE REVISIÓN: MAYO 2020

BASF Peruana S.A

Oficinas y Fábrica
Av . Oscar R. Benavides 5915
Callao, Lima - Perú
Central +51 1 513-2500
Fax +51 1 513-2518
E-mail basfperu@basf.com
www.basf.com.pe

Representantes exclusivos

De BASF SE
67056 Ludwigshafen
Alemania

Registro

Inscrita en la partida N° 11007979
de la Oficina Registral de Lima y Callao

Certificación ISO 9001:2008

Certificado PE13/175158
"Fabricación y Comercialización de
Productos Químicos para la Industria en
General y Comercialización de Productos
para la Protección de Cultivos"

